



© Bastian.S 2024™

TARMSYGDOMME KENDER INGEN GRÆNSER



COLITIS - CROHN FORENINGEN
FORENING FOR TARMSYGE



Galdesyrediarré

Galdesyreomsætningsproblemer skyldes manglende optagelse af galdesyre i den nederste del af tyndtarmen. Det er kun her, at optagelsen finder sted. Problemer med galdesyrenerne viser sig som diarré.

Årsagerne til forstyrrelser i galdesyreomsætningen kan være sygdom i den nederste del af tyndtarmen bl.a. Crohns sygdom, følger efter operation med fjernelse af et stykke tyndtarm, stråleskadet tyndtarm, sukkersyge, galdestensoperation og ukendte årsager.

Det er ikke en ondartet lidelse, men den kan være hæmmende for den daglige funktion grundet symptomerne, der kan følge med i varierende grad

Diagnosen stilles ved en scanning, som hedder SeHCAT, der foregår med at der

én dag skal sluges en kapsel med en lille smule ufarligt radioaktivt sporstof, som tarmene vil optage og blive udskilt igen. Tre timer efter indtagelse scannes maveregionen og syv dage efter scannes en gang til. Derefter burde resultatet foreligge. Det er dog ikke en rutine alle steder at anvende denne undersøgelse. Nogle gange vurderer man om en behandling rettet imod tilstanden har effekt. Behandlingen består af midler, som binder galdesyre i tarmen.

i

Symptomer

- Kronisk vandig diarré (inkontinens).
- Hyppige toiletbesøg.
- Træthed.
- Mavekneb.
- Flatulens (prutter).
- Social invaliderende sygdom.

En dansk undersøgelse har vist effekt af et middel, som bruges i behandlingen af sukkersyge. Denne behandling er dog endnu ikke standard og kræver daglige indsprøjtninger med lægemidlet. Indtil videre er behandlingen derfor forbeholdt særlige tilfælde.